

Số: /TB-UBND

Long Phụng, ngày tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cây lúa (giai đoạn trước - sau trổ) và cây trồng cận vụ Đông Xuân 2025-2026.

Đến ngày 13/03/2026, các trà lúa trên địa bàn xã đang bước vào giai đoạn Đòng- Trổ (trà chính vụ 784 ha giai đoạn Đòng già- Trổ lác đác; trà muộn 301 ha giai đoạn Đòng dài từ 04-12cm). Các cây trồng cận đa phần đang giai đoạn Đậu quả - thu hoạch (cây ớt: giai đoạn đậu quả - thu hoạch; cây ngô giai đoạn trổ cờ, phun râu - chín sữa,...).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, kể từ ngày 09/03/2026 trên địa bàn xã có mưa - nắng xen kẽ liên tục, độ ẩm đồng ruộng cao là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, phát triển gây hại. Thực tế kiểm tra đã phát hiện bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, rầy nâu, ... đã bắt đầu phát sinh; chuột tiếp tục gây hại tại nhiều xứ đồng,... dự báo các đối tượng trên sẽ tiếp tục phát triển gây hại mạnh trong thời gian tới.

Để đảm bảo cây trồng vụ Đông Xuân 2025-2026 sinh trưởng tốt và đạt năng suất cao. UBND xã Long Phụng thông báo hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc như sau:

1. Đối với cây lúa:

1.1 Nước tưới và phân bón:

- Duy trì mực nước 3-5cm từ khi có đòng-chín sấp.
- Không bón thừa phân đạm; nên bổ sung phân bón lá có chứa Kali, vì lượng để tăng cường tính chống chịu, cứng cây, no mẩy hạt lúa,...

1.2 Sinh vật gây hại:

- **Bệnh đen lép hạt:** Tiến hành phun phòng bắt buộc 02 lần (Kết hợp phun phòng bệnh do nấm và do vi khuẩn: Lần 1: khi lúa trổ lác đác 3-5%; Lần 2: khi lúa trổ đều) để đảm bảo sáng hạt, chắc hạt. Đặc biệt chú ý phun phòng trà lúa đang trổ lác đác tại các thôn Phú An, thôn Phước Sơn...

- **Bệnh Đạo ôn:** (trên lá, cổ bông, cổ lá đòng): thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm và phun trừ ngay. Bệnh rất dễ phát sinh trên các giống nhiễm, ruộng sạ dày, bón phân thừa đạm,... trong điều kiện thời tiết âm u, độ ẩm cao, trời lạnh.

Lưu ý:

+ Khi phun thuốc phải đảm bảo có nước trong ruộng, thuốc phun phải ướt ẩm hết cây lúa (25 lít nước/sào).

+ Những ruộng đã từng xuất hiện đạo ôn lá ở giai đoạn có dòng trở về trước thì bắt buộc phải phun phòng đạo ôn cổ bông ngay khi lúa bắt đầu trổ.

+ Tạm ngừng bón phân cho đến khi vết bệnh dừng hoàn toàn để tránh bệnh phát triển mạnh hơn.

- **Bệnh khô vằn:** Thường xuyên kiểm tra trên các trà lúa giai đoạn từ dòng- ngâm sữa, nếu phát hiện tỉ lệ bệnh từ 5-10% trở lên thì tiến hành phun trừ.

- **Chuột:** tiếp tục đặt bẫy, bả, không sử dụng điện để diệt chuột.

- **Rầy nâu:** Thường xuyên kiểm tra vạch gốc lúa kiểm tra tại nhiều điểm trên ruộng (chú ý các chòm xanh đậm, sạ dày, bón thừa đạm, giống nhiễm,...), Nếu thấy rầy cám (1-2 tuổi) nở rộ với mật độ từ 2-3 con/dảnh (hoặc >1.000 con/m²) giai đoạn trước trổ và từ 3-5 con/dảnh (hoặc >2.000 con/m²) giai đoạn sau trổ phải tiến hành phun trừ ngay bằng các loại thuốc đặc trị.

Lưu ý:

+ Phun kỹ vào gốc lúa, giữ mực nước ruộng 3-5cm để hiệu quả thuốc cao nhất.

+ Lưu ý chỉ phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát . Sau 4-5 ngày kiểm tra lại nếu mật độ rầy còn cao phải phun lại lần 2.

- **Các đối tượng sâu hại khác:** sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít,... thường xuyên thăm đồng và chỉ phun trừ khi mật độ sâu tới ngưỡng phòng trừ.

2. Đối với cây trồng cận:

2.1 Hướng dẫn chung: Thường xuyên kiểm tra đồng để phát hiện sớm sâu bệnh hại để phòng trừ:

- **Cây ớt:** Vệ sinh ruộng, tỉa lá cho thông thoáng để hạn chế thán thư. **Bắt buộc** tuân thủ thời gian cách ly trước khi hái quả.

- **Cây ngô:** Kiểm tra sâu keo mùa thu, phun xoáy vào loa kèn đối với trà ngô muộn.

- **Thoát nước:** Khơi thông mương rãnh ngay sau mưa, tránh để ngập úng gây thối rễ.

- **Nhóm rau ăn lá:** hạn chế sử dụng thuốc hóa học, nên sử dụng các thuốc có nguồn gốc sinh học, thuốc thảo mộc,..

3. Những lưu ý về thuốc bảo vệ thực vật và phòng, chống sinh vật gây hại:

- Tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột.

- Phòng, chống sinh vật gây hại thực hiện theo phương châm phòng là chính; áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp sinh vật gây hại theo hướng bền

vững, trong đó ưu tiên biện pháp sinh học, sử dụng giống cây trồng chống chịu sinh vật gây hại, biện pháp kỹ thuật canh tác, thực hành nông nghiệp tốt.

- Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sinh vật gây hại phải tuân thủ những quy định về an toàn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

- Phải thực hiện nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách. Đọc kỹ hướng dẫn ghi trên bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật trước khi sử dụng.

- Chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Môi Trường ban hành để phòng trừ sinh vật gây hại (*tham khảo phụ lục thuốc BVTV*).

Trên đây là hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cây lúa (giai đoạn trước-sau trổ) và cây trồng cạn vụ Đông Xuân 2025-2026. Đề nghị Phòng Kinh tế xã, Ban dân chính các thôn, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và các HTX Nông nghiệp kịp thời thông báo, hướng dẫn để nhân dân biết, chủ động kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp phòng trừ có hiệu quả, đảm bảo thắng lợi vụ Đông Xuân 2025-2026./.

Nơi nhận:

- CT, PCT. UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công;
- Các HTX Nông nghiệp;
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Tuấn

PHỤ LỤC. MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SỬ DỤNG ĐỂ PHÒNG TRỪ SINH VẬT GÂY HẠI*

(Kèm theo Thông báo số: /TB-UBND ngày /03/2026 của UBND xã Long Phụng Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cây lúa (giai đoạn trước-sau trổ) và cây trồng cận vụ Đông Xuân 2025-2026).

Sinh vật gây hại/ cây trồng	Nhóm hoạt chất / Tên thuốc	Lưu ý
1. Bệnh Đạo ôn/ Lúa	Tricyclazole (Beam 75WP), Fenoxanil (Katana 20SC), Isoprothiolane (Fuji-one 40EC),...	- Phun phòng đạo ôn cổ bông khi lúa trổ lác đặc (đã từng có nhiễm bệnh đạo ôn lá). - Giữ nước trong ruộng, phun ướt đầm thân, lá, bông - Ngừng bón đạm khi vết bệnh đang phát triển.
2. Bệnh đen lép hạt/ Lúa	Trừ nấm: Difenoconazole + Propiconazole (Tilt Super 300EC), Azoxystrobin (Amistar Top 325SC),...	Phun 02 lần: Lần 1 khi trổ 3-5%; Lần 2 khi trổ đều. Nên phối hợp thuốc trừ nấm và vi khuẩn để đạt hiệu quả cao nhất. Nếu sau phun dưới 6h gặp mưa phải phun lại
	Trừ vi khuẩn: Ascorbic acid + Citric acid + Lactic acid (Agrilife 100SL), Kasugamycin (Kasumin 2SL), Chitosan (Youkio 50SL), Quaternary Ammonium (Sporekill 120SL),...	
3. Bệnh Khô vằn/ Lúa	Validamycin (Validacin 5L), Hexaconazole (Anvil 5SC),...	- Phun tập trung vào phần thân - gốc lúa. - Kết hợp rút cạn nước ruộng (phơi lộ) để giảm ẩm độ.
4. Sâu cuốn lá/ Lúa	Indoxacarb (Ammate 150SC), Chlorantraniliprole (Virtako 40WG, Prevathon 5SC), ...	- Phun khi mật độ từ 10-20 con/m ² (giai đoạn đòng - trổ) để bảo vệ lá đòng.
5. Rầy nâu/ Lúa	Pymetrozine (Chess 50WG), Dinotefuran (Osheen 20WP), Nitenpyram (Pexena 20WG),...	- Vạch gốc lúa và phun kỹ vào gốc. - Không phun từ 9h-15h (lúc lúa đang thụ phấn). - Giữ nước ruộng 3-5cm. - Sau 4-5 ngày nếu mật độ rầy còn cao phải phun lần 2
6. Chuột gây hại	Thuốc chống đông máu (Racumin 0.75TP),...	Tuyệt đối không dùng điện.
7. Bệnh Thán thư/ Ôt	Azoxystrobin (Ortiva 250SC), các thuốc gốc Đồng...	- Thu gom, tiêu hủy quả bệnh để tránh lây lan. - Cách ly (PHI): Ít nhất 7-10 ngày trước khi thu hoạch.

* Danh mục thuốc trên mang tính chất khuyến cáo kỹ thuật. Bà con có thể sử dụng các loại thuốc khác có **hoạt chất tương tự** đang có bán tại các đại lý vật tư nông nghiệp địa phương để xử lý.